

مقایسه افراد مبتلا به اسکیزوفرنی و افراد عادی بر اساس آزمون نوروسایکولوژی استروپ

افشان نیک نفس

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین‌الملل کیش، کیش، ایران

چکیده

ارتباط مغز و روان امری بدیهی است. ابزارهای نوروسایکولوژی کمک شایانی در زمینه ارزیابی کارکردهای شناختی در افراد سالم و بیماران مبتلا به اختلالات روان‌پزشکی و مغزی کرده است. در این پژوهش از آزمون نوروسایکولوژی استروپ^۱ استفاده شده است. آزمون استروپ آزمون رایجی برای ارزیابی کارکردهای اجرایی، توجه انتخابی و تمرکز به شمار می‌رود. در این آزمون، آزمودنی باید رنگ واژه‌هایی را که با رنگ‌های مختلف نوشته شده است بدون توجه به معنای آن‌ها بیان کند این آزمون برای سنجش لوب پیشانی استفاده می‌شود. در این پژوهش عملکرد افراد دارای اختلال اسکیزوفرنی و افراد عادی مورد مقایسه قرار گرفته است. از اهداف علمی این پژوهش مقایسه عملکرد لوب پیشانی افراد مبتلا به اسکیزوفرنی و افراد عادی می‌باشد. از اهداف کاربردی می‌توان عنوان کرد که با استفاده از آزمون‌های نوروسایکولوژی استروپ عملکرد و شدت نواقص شناختی در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی را بهتر بشناسیم و این یافته‌های به‌دست‌آمده را می‌توان در درمان افراد اسکیزوفرنی به کار بریم. در واقع یافته‌های این پژوهش ما را به سوی درمان بهتر برای افراد مبتلا به اسکیزوفرنی سوق می‌دهد. روش آماری در این پژوهش پس رویدادی (علی مقایسه‌ای) است و روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب‌شده و طی آن ۳۰ فرد اسکیزوفرنی و ۳۰ فرد عادی انتخاب‌شده در عملکرد آن‌ها با استفاده از آزمون استروپ سنجیده شده و مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که عملکرد افراد مبتلا به اسکیزوفرنی تفاوت بارزی با افراد عادی داشتن که نشان‌دهنده نقص شناختی در لوب پیشانی افراد مبتلا به اسکیزوفرنی می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: اسکیزوفرنی، آزمون استروپ، نوروسایکولوژی، لوب پیشانی، افراد عادی، نواقص شناختی

^۱ neuropsychological stroop test

مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی

دوره ۴، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۷، صفحات ۶۲-۷۱