

## مقایسه‌ی ایده پردازی خودکشی در بین افراد سالم و بیماران مبتلا به سرطان شهرستان بابل

نسرین رحمان پور<sup>۱</sup>، سهیلا نظرپور<sup>۲</sup>، داریوش مسلمی<sup>۳</sup>

<sup>۱</sup> کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

<sup>۲</sup> هیئت علمی گروه روانشناسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

<sup>۳</sup> هیئت علمی گروه روانشناسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

### چکیده

از آنجایی که در بیماران مبتلا به سرطان ایده پردازی خودکشی از اهمیت خاصی برخوردار است، این پژوهش به منظور مقایسه ایده پردازی خودکشی در بین افراد سالم و بیماران مبتلا به سرطان شهرستان بابل طراحی شد. طرح این مطالعه پس رویدادی در مقوله‌ی علی-مقایسه‌ای قرار می‌گیرد و کلیه جامعه آماری این مطالعه را افراد مبتلا به سرطان و عادی شهرستان بابل تشکیل دادند و تعداد ۱۰۰ نفر (۵۰ نفر مبتلا به سرطان و ۵۰ نفر سالم) به عنوان نمونه انتخاب شدند، نمونه‌گیری به صورت «در دسترس» و تعیین جفت‌های هم‌تراز صورت گرفت. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این مطالعه، پرسش‌نامه افکار خودکشی بک بود که توسط افراد هر دو گروه به صورت انفرادی تکمیل گردید. برای بررسی آماری از تحلیل ناپارامتریک کروسکال والیس با کاربرد SPSS۲۰ استفاده شد. نتایج نشان داد که بین میزان ایده پردازی خودکشی و سه خرده مقیاس (تمایل به مرگ، آمادگی برای خودکشی و تمایل به خودکشی واقعی) بیماران مبتلا به سرطان و افراد عادی تفاوت معناداری وجود ندارد، همچنین در بررسی خرده مقیاس تمایل به مرگ نتایج نشان داد که این مؤلفه در بین دو گروه بیماران سرطانی و سالم تفاوت معنی‌داری ندارد ( $P=0/092$ ) و در بیماران سرطانی نیز با توجه به نوع سرطان ( $P=0/83$ ) و نوع روش درمانی ( $P=0/65$ ) تفاوت معنی‌داری در این خرده مقیاس به دست نیامد. اهمیت نقش ایده پردازی خودکشی در بین افراد مبتلا به سرطان و سالم تفاوت ندارد. از آنجایی که میزان خودکشی در سال‌های اخیر افزایش یافته، این موضوع مستلزم تحقیقات بیشتر است.

**واژه‌های کلیدی:** سرطان، ایده پردازی خودکشی، تمایل به مرگ

مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی

دوره ۷، شماره ۳، پاییز ۱۴۰۰، صفحات ۳۱۷-۳۰۶